


Instrucciones de uso
NAYZILAM® (NAY-zil-am)
(midazolam) aerosol nasal, CIV

Usted y los miembros de su familia o cuidadores deben leer estas Instrucciones de uso antes de que comience a usar el aerosol nasal NAYZILAM y cada vez que reciba una recarga. Es posible que haya información nueva. Esta información no toma el lugar de la consulta con su proveedor de atención médica acerca de su afección médica o tratamiento. Si usted y los miembros de su familia o los cuidadores tienen alguna pregunta sobre NAYZILAM, consulte a su proveedor de atención médica o farmacéutico.



Importante: NAYZILAM es para uso nasal solamente.

- **Hay solo 1 dosis de NAYZILAM en la unidad de aerosol nasal.**
- **No** trate de probar o preparar la unidad de aerosol nasal antes de su uso. Perderá la dosis.
- **No** abrir el blíster hasta que esté listo para usarlo.
- **No** usar si la unidad de aerosol nasal parece dañada.
- **No** usar si la fecha de vencimiento impresa en el blíster ha caducado.
- Deseche (elimine) la unidad de aerosol nasal después de su uso.

Figura 1



Cómo usar el aerosol nasal NAYZILAM:

Paso 1: Despegue el blíster.

- Cuando esté listo para usar, abrir el blíster.
- Sostenga el blíster en la palma de la mano.
- **Sobre la base de aluminio, encuentre la etiqueta "Despegue aquí" y tire hacia abajo (consulte la Figura 1).**
- Retire la unidad de aerosol nasal con cuidado.

Figura 2



Paso 2: Sostenga la unidad de aerosol nasal.

- Sostenga la unidad de aerosol nasal con su pulgar en el émbolo y los dedos medio e índice a cada lado del atomizador (**consulte la Figura 2**).
- **No presione el émbolo todavía. Si presiona el émbolo ahora, perderá la dosis.**

Figura 3



Paso 3: Coloque la punta en 1 fosa nasal

- Coloque la punta del atomizador en 1 fosa nasal hasta los dedos en cualquiera de los lados del atomizador toquen la parte inferior de la nariz (**consulte la Figura 3**).

Figura 4



Paso 4: Presione el émbolo.

- Presione el émbolo con firmeza para administrar la dosis del aerosol nasal NAYZILAM (**consulte la Figura 4**).
- Asegúrese de presionar firmemente el émbolo con 1 movimiento.

El paciente no necesita respirar profundamente cuando se le administra el medicamento.

Qué hacer después de que el aerosol nasal NAYZILAM se ha usado:

Retire el atomizador de la fosa nasal después de administrar la dosis.

Nota: El émbolo permanecerá dentro de la unidad de aerosol nasal después de que se administre la dosis.

Deseche (elimine) la unidad de aerosol nasal y el blíster en la basura.

Qué debe hacer si una segunda dosis es necesaria:

Importante: Si la crisis epiléptica en clúster continúa **10 minutos** después de la primera dosis de NAYZILAM, una segunda dosis de NAYZILAM **podrá ser administrada si su proveedor de atención médica le ha indicado hacerlo.**

Si necesita administrar una segunda dosis de NAYZILAM, siga las indicaciones en estas Instrucciones de Uso utilizando una nueva unidad de aerosol nasal **en la otra fosa nasal.** (Repetir del Paso 1 al Paso 4)



Llame para solicitar ayuda si se presenta alguna de las siguientes posibilidades:

- Las crisis epilépticas continúan después de administrar NAYZILAM a la persona según lo indicado por el proveedor de atención médica.
- El comportamiento de la crisis epiléptica en la persona es diferente de otros episodios.

Número de emergencia local:

Número del proveedor de atención médica:

- Se alarma por la cantidad o gravedad de las crisis epilépticas en la persona.
- Se alarma por la coloración o respiración de la persona.

Información para el respondedor de emergencia

Hora de la primera dosis de NAYZILAM: _____

Hora de la segunda dosis de NAYZILAM (si se administra): _____

Fabricado para UCB, Inc., Smyrna, GA 30080.

NAYZILAM® es una marca comercial registrada de UCB. ©2021. Todos los derechos reservados. Para obtener más información, visite www.nayzilam.com o llame al 1-844-599-2273.

Estas Instrucciones de uso han sido aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU.

Emitido: 1/2023